

Vaccination Schedule for Children

Well-Child Check-up & Shots: Children from birth to 17 years old

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends annual flu vaccines for everyone age 6 months or older. Check with your doctor when flu season starts to see if it's right for your child. At your child's next visit, make sure to tell your doctor if your child will be traveling out of the US, they may need extra shots. If your child is behind on shots, your doctor can make a plan to get all their shots done.











































Well-Child Check-up		Blood Screen		Shots		Vision Screen	
Hearing Screen		FLU SHOT		Ask about the flu shot			
Age		Recommended Vaccines & Tests					
Birth	   (Hepatitis B)						
3-5 days							
7-14 days							
2 months	  (DTaP, Hep B, Hib, PCV, Rotavirus, IPV)						
4 months	  (DTaP, Hib, PCV, Rotavirus, IPV)						
6 months	  (DTaP, Hep B, PCV, Hib & Rotavirus if needed, IPV)						
9 Months							
12 months	  (MMR, Hepatitis A, Varicella, Hib if needed, PCV)						
15-18 months	  (DTap)						
2 years	  (Hepatitis A)						
3 years							
4 years	     (DTaP, IPV, Varicella, MMR)						
5 years							
6, 8, and 10							
11 years	  (HPV — in 2-3 doses given 6 months apart), Tdap, MCV)						
12 years							
13 years							
14 & 15 years							
16 years	  (MCV booster)						
17 years							

DTaP – Diphtheria, Tetanus, Pertussis. **Hep B** – Hepatitis B. **Hib** – Haemophilus influenza type b. **PCV** – Pneumococcal conjugate vaccine. **IPV** – Polio vaccine. **MMR** – Measles, Mumps, and Rubella. **HPV** – Human papillomavirus. **Tdap** – Diphtheria, Tetanus, Pertussis. **MCV** – Meningococcal conjugate vaccine.

Calendario de Vacunación Para Niños

Vacunas y exámenes para niños sanos: Desde que nacen hasta los 17 años

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan vacunas anuales contra la gripe para niños a partir de los 6 meses de edad. Para saber si su hijo las necesita, consulte con su doctor al comienzo de la estación de la gripe. En la próxima visita de su hijo, no olvide decirle al doctor si su hijo viajará fuera de los Estados Unidos. Es posible que necesite más vacunas. Si su hijo no tiene todas las vacunas que necesita, el doctor puede hacer un plan para que las reciba.

Edad		Vacunas y Pruebas Recomendadas	
Recién nacido	   (Hepatitis B)	  	 Consulte sobre la vacuna contra la gripe.
3 a 5 días			
7 a 14 días			
2 meses	  (DTaP, hep. B, Hib, PCV, rotavirus, IPV)		
4 meses	  (DTaP, Hib, PCV, rotavirus, IPV)		
6 meses	  (DTaP, Hep B, PCV, Hib & rotavirus si es necesario, IPV)		
9 meses			
12 meses	  (MMR, hepatitis A, varicela, Hib, PCV)		
15 a 18 meses	  (DTap)		
2 años	  (Hepatitis A)		
3 años			
4 años	     (DTaP, IPV, varicela, MMR)		
5 años			
6, 8 y 10 años			
11 años	  (HPV: 2 o 3 dosis aplicadas con 6 meses de diferencia), Tdap, MCV)		
12 años			
13 años			
14 y 15 años			
16 años	  (Dosis de refuerzo de la MCV)		
17 años			

DTaP: difteria, tétanos, tosferina. Hep B: hepatitis B. Hib: haemophilus influenza tipo B.
PCV: vacuna antineumocócica conjugada. IPV: vacuna antipoliomielítica.
MMR: sarampión, paperas, rubéola. HPV: virus del papiloma humano.
Tdap: difteria, tétanos, tosferina. MCV: vacuna antimeningocócica conjugada.